

何提高对本病的早期诊断,尚待继续研究。我们体会,深入细致的病史调查,尤其是病畜咬伤历史,是早期诊断的前提,临床上密切的病情观察常为本病诊断提供重要的资料;其次对来自农村的病人,如出现不能为其它疾病解释的兴奋躁动表现,应提高警惕。有文献提出早已痊愈的伤疤出现异样感觉对本病早期诊断的意义,根据我们临床上多年来对狂犬病人的追询及观察,未能发现其有何价值。

3.对被疯狗或病畜(兽)咬伤史的看法:本例确诊为狂犬病,可是对其被病畜(兽)咬伤历史无法证实。正因为这个关系,影响到对生前狂犬病的诊断。应该承认,狂犬病的病人有被咬史几乎占90—95%以上,但仍有极少数患者是通过下列方式感染的,例如:宰狗猫,饲养病畜,病畜(兽)舐拭

皮肤或肛门,甚或可通过蝙蝠由空气传染。本例感染狂犬病毒的方式如何?病史中难以核实。但这里起码说明流行病学资料对狂犬病的诊断并不是绝对的,临床诊断上应提倡辩证的全面的分析方法。

4.饮酒与狂犬病发病的关系:本例于会餐饮酒后发病。对此,我们复习以往见到的狂犬病例,亦曾见到两例于酒后发病。例如病人余××,男,58岁,干部,劳动后回家,晚餐喝当归枸杞酒一两,午夜即发病,狂犬病的临床表现很典型,死后尸检亦证实为狂犬病。以往文献,关于狂犬病的诱发因素,很少提及饮酒问题,是否饮酒可以诱发,有待今后临床进一步观察。

(本文图1—6见封底)

参考文献(略)

(谢周生 挑铁钩整理)

外地经验摘要

金荞麦* 治疗肺脓疡

一、药物配制及用法:取干金荞麦根茎(去须)250克切薄片,加水或黄酒1250毫升,置于瓦罐内,以竹箬封口,隔水文火蒸煮3小时,再加适量防腐剂即成。有水剂与酒剂两种。用时成人每服40毫升,每日3次,小儿酌减。在病情迁延,持续高热,脓痰排不出或排不尽时,服用酒剂为佳。

二、临床资料:本组病例,绝大多数为农民,男性多于女性,青壮年占多数。全部患者有咳嗽,多数有高热、寒战、胸痛、气短、不能平卧、咯吐脓痰,部分有咯血。

三、疗效观察:共治疗506例,痊愈(症状消失,X线检查示病灶完全吸收)462例,占91.3%;好转(症状基本消失,X线检查示病灶基本吸收)44例,占8.7%。多数患者在服药1周左右退热。服药后可排出大量脓痰,一般2周左右排尽。其它症状随脓痰的

排出而逐渐减轻以至消失。服药期间未发现不良反应。

(摘自《新医药学杂志》1975年第8期)

*金荞麦为蓼科荞麦属植物,别名野荞麦、赤地利、酸荞麦、苦荞头等,学名 *Fagopyrum Cymosum*(Trev.) Meisn.

—本刊—

中药治疗扁平疣

药物与用法:板蓝根1两 大青叶1两 苡仁(缺货时以苡实代)5钱 紫草3钱。亦可根据病情加用红花2钱 牡蛎1两。用时以内服与外洗相结合,每剂药煎服2次,外洗1次,洗时以纱布沾药液轻擦患处皮肤至微红(约需15—20分钟)。

治疗结果:

有完整资料的58例中,基本痊愈(皮疹全部消退或留下色素沉着斑)18例,占37%;好转(皮疹有程度不同的消退)16例,占27.6%;无效(用本方15剂后皮疹无明显改变)24例,占41.4%。有效率为58.6%。

(摘自《中草药通讯》1975年第4期)